

## دراسة حالة مرضية

### استئصال الزائدة اللاحق انتقائيا أو روتينيا لدرع الزائدة المعالجة بطريقة غير جراحية

د. حمد القحطاني، ا.د. محمد خورشيد عالم، د. محمد العقيلي، ا.د. صالح السلامة  
قسم الجراحة ، كلية الطب ، جامعة الملك سعود ، الرياض، المملكة العربية السعودية

#### هدف البحث

إن الغرض من هذه الدراسة هو تقييم الحاجة إلى استئصال الزائدة اللاحق بعد المعالجة المحافظة البدئية الناجحة لدرع الزائدة .

#### طريقة البحث

أجريت دراسة ارتجاعية لمرضى درع الزائدة الذين تلقوا معالجة محافظة بدئية ناجحة في مجمع الملك سعود الطبي من يوليو 2004 حتى يوليو 2009. وقد جمعت المعلومات عن التوزيع السكاني ، الأعراض عند دخول المستشفى، والاستقصاءات، وسجلات المتابعة، وعود الأعراض، و / أو عودة التهاب الزائدة الحاد، وتم تحليل هذه المعلومات.

#### النتائج

طبقت المعالجة المحافظة لدرع الزائدة لما مجموعه 73 مريضا. وتمت متابعتهم جميعا في العيادات الخارجية بعد تخريجهم من المستشفى عقب المعالجة المحافظة الناجحة. أجري استئصال زائدة لاحق لسبعة مرضى (9,6%) بسبب عودة الأعراض، بينما تم إنهاء مراجعات 66 مريضا (90,4%) من العيادة الخارجية، حيث بقوا بدون أعراض لزيارتين على الأقل. تم استدعاء جميع المرضى وإعادة تقييمهم في العيادة الخارجية خلال فترة جمع المعلومات لهذه الدراسة. حصل التهاب زائدة معاود 5 لخمسة مرضى (6,8%) وأجري لهم استئصال زائدة ملتهبة إسعافي في مكان آخر. أي أن ما مجموعه 12 مريضا (16,4%) احتاجوا لاستئصال الزائدة بعد المعالجة المحافظة البدئية الناجحة لدرع الزائدة، بينما بقي 61 مريضا (83,6%) بدون أعراض خلال فترة هذه الدراسة.

#### الاستنتاجات

إن استئصال الزائدة اللاحق الروتيني بعد المعالجة البدئية الناجحة لدرع الزائدة هو إجراء غير ضروري، ويجب أن يوصى به انتقائيا لمن تعود لديهم الأعراض أو لمن يعود لديهم التهاب الزائدة .

#### كلمات مفتاحية

التهاب الزائدة، استئصال الزائدة، درع الزائدة، استئصال الزائدة اللاحق.